中国医学物理学杂志第卷第期 年  月
间秒多次凝固为最佳
 因为微波较大功率短时间多
次凝固不易受胃肠蠕动的影响
 安全可靠

微波的热效
应使局部癌组织坏死凝固
 梗阻狭窄症状解除观察证
明对隆起病灶可选择较大功率
 凹陷病灶宜用较小功
率
 理想的微波输出分别是 	
   又

中国医学物理学杂志第卷第期  年  月
成

在高冠心的发病因素中
 生活水平提高
 膳食中胆
固醉或饱和脂肪酸含  增多
 使血液粘度升高为发病
的重要因素由于血液粘度增高
导致冠脉血流缓慢

痪滞
 加重心肌缺血
微循环障碍
甚至血栓形成所以
高血压病冠心病均属血寮症
 而血痕症往往有血流变
特性的异常山海丹  号含有多种活血化寮中药
 其中
人参黄蔑丹参等能抑制血小板粘附聚集
 增强红细
胞变形能力
 降低血脂
 具有显著降低高血粘度作用

因此可改善血液流变性
 这也正是山海丹  号治疗高
血压冠心病的机理所在
用脉宽比值测定电介质的介电常数 01
王晓聆杨英波  山东医科大学物理教研室济南    
由电容器公式知 # 一  与 ) 2 
  带电介质与不带板间隙中分别插入瓷砖片玻璃云母片三合板等物
电介质的电容值是不同的
 笔者用多谐振荡器发出的后
 示波器显示出不同的脉宽 !
 因脉宽 ! 是随电介
脉冲波去触发单稳态触发器
 以产生连续方波脉冲由质性质
 及其厚度 2 的变化而变化
 倘若这些材料具
示波器显示
 而单稳态触发器通过电阻 " 经平电同的厚度
 器 É 电 º 电电数脉宽