中国男科学杂志2015年第29卷第7期 61
复方玄驹胶囊治疗精液不液化的临床观察
张凯16 董业浩26 时荣同1 马楠1
安徽宿州234.75)；浩26

62 Chinese Jounlal of Andrology V01．29 No．7 201 5
表1 两组治疗前后精液质量各项指标变化
组别例数显效有效无效有效率(％)
治疗组 110 36 49 25 77．27+
对照组 68 14 22 32 52．94
注：与对照组比较，≯<O．Ol
二、两组间治疗前后精液质量各项指标变化
治疗前两组精液量、精子浓度、精子活率、活
力、前向运动精子等指标比较，无统计学差异(尸>
0．05)。治疗后，对照组精子活率、活力和前向运
动精子均较治疗前显著提高(尸<0．05)，治疗组精
液量、精子浓度、精子活率、活力和前向运动精子
也较治疗前均明显提高(尸<0．05)；治疗后两组
比较，治疗组明显优于对照组，差异具统计学意义
∽<0．05)，见表2。
两组精子运动参数比较：治疗后治疗组VSL、
STR、MAD等指标均优于对照组(_尸<0．05)，见表3。
两组患者均全部完成治疗，治疗期间对照组3�ET�Q�q�BT�/TextFont_43 7 Tf�0175�1.156566 0 Tf� 326 cm�有胃肠道不适，改为餐后口服后缓解)，见表3。
32
52£®94

中国男科学杂志2015年第29卷第7期