垒堕墨兰皇堕座!!!!±!旦箜!!鲞整!!塑生!!坚!!竺!!!：!!!：!!!!：∑坐上三尘坠兰

关研究[J]．河北医学，2013，6(19)：801—805．
[63霍奇帆，王丽美，吕黄伟．右美托咪啶对全麻非心脏手术患者术后早期认知功能障碍影响的Meta分析[j]．中国循证医学杂志，2014，10(14)：1225—1 233．
[7]魏智慧，赵欣，高建华，等．亚甲蓝肋问神经阻滞联合地佐辛胸科术后镇痛的效果[J]．西南国防医药，2014，12 (24)：1350—1352，

[83郭燕芬，冯顺华，韩超，等．全麻复合硬膜外阻滞对老年菲心脏手术患者术后认知功能障碍的影响[J]．江苏医药， 2014，40(23)：2925—2926．
[9]肖桂梅．吗啡可乐定术后硬膜外自控镇痛的临床研究 [J]．医学临床研究，2008，25(12)：2228—2230．
· 临床探讨·

[10]唐正国，常业恬．曲马多用于剖宫产术后静脉自控镇痛的临床效果评价[J]．医学临床研究，2008，25(11)：1975—

1977。

Eli]Falzone E，Hoffinann C，Keita H．Postoperative analgesia in elfrly�

[2]Yive in

．1712． 望堕垦堂皇坚盎!!!!主!旦箜!!鲞笪!!塑生!!竺旦L￡坐L韭翌旦三型旦』!生二-翌二蔓生旦
志，2004，20(3)：136—1 37． 的研究[J]．广州中医药大学学报，2010，10(6)：68-78．
r3]中华医学会．I临床诊疗指南(妇产科学分册)[M]．北京： [7]谢小青，王晓敏，徐鹰，等．新稀宝配合克罗米芬治疗排卵
人民卫生出版社，2007：118． 功能障碍的临床疗效观察[j]．生殖与避孕，201。，30(5)：
[4]国家中医药管理局．中医病证诊断疗效标准[M]．南京： 358—359·
南京大学出版社，2008：76 Es]司秀真．中西医结合治疗肾阳虚型不孕症63例[J]·河南
[5]赵铭峰，王聪，冯少林，等．从肾论治排卵功能障碍性不孕中医，2012，32(7)：891—892·
症的临床研究进展[J]．辽宁中医药大学学报，2008，10
(12)：40一42． <收稿日期：2015—12—21 修回日期：2016。2—24)
[6]陈春晓．卵巢储备功能下降中医证侯特征及内分泌特征
·临床探讨·
综合护理干预对2型糖尿病患者血糖血脂水平及心脑血管事件的影响
景良洪，曾艳丽，宋凤平
(重庆市人民医院三院院区内分泌科400014)
摘要：目的探讨综合护理干预对2型糖尿病患者血糖、血脂水平及心脑血管事件的影响。方法选取重庆市人民医院三
院院区2011年3月至2012年7月收治的144例确诊为2型糖尿病的患者，按数字表随机分配法分为综合干预组和对照组各72
例，对照组患者实施糖尿病患者常规护理，干预组患者给予综合护理干预，所有患者随访到201 5年7月，对比护理前、后两组患者
血糖、血脂水平及两组患者心脑血管事件发生情况。结果 (1)干预组患者护理后空腹血糖、糖化血红蛋白、胆固醇、低密度脂蛋
白胆固醇及体质量指数水平分别为(5．91±3．42)mmol／I。、(6．14±0．98)％、(3．75士1．35)mmol／L、(2．01±0．54)mmol／L、
(24．9±2．7)kg／m2，与护理前的(6．87±4．25)mmol／L、(7．27±1．36)％、(4．55±1．41)mmoi／L、(2．65±0．89)mmoi／L，(26．9±
3．8)kg／m2比较明星下降，差异有统计学意义(P<O．05)；而且与对照组护理后差异也有统计学意义(P<0．05)。(2)干预组总心
血管事件发生6例，对照组发生13例，对比差异有统计学意义(P<0．05)；其中干预组心脑血管死亡2例，对照组心脑血管死亡7